

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Нольпаза® 20 мг

таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой

Действующее вещество: пантопразол

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Нольпаза® 20 мг, таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой.

2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

1 таблетка содержит 20 мг пантопразола в виде пантопразола натрия сесквигидрата (22,55 мг).

Вспомогательные вещества: сорбит (E420), маннит (E421), кросповидон, натрия карбонат, кальция стеарат и др.

3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой.

Овальные, слегка двояковыпуклые, светло-желтовато-коричневого цвета.

4. КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

4.1 Показания к применению

Кратковременное лечение симптомов гастроэзофагеального рефлюкса у взрослых (изжога, кислая отрыжка).

4.2 Способ применения и дозы

Рекомендуемая доза — 20 мг (1 таблетка) 1 раз в сутки перед едой.

Таблетку глотать целиком, не разжевывать.

Для купирования симптомов может потребоваться 2–3 дня приема.

Не применять более 4 недель без консультации врача.

4.3 Противопоказания

- повышенная чувствительность к пантопразолу или вспомогательным веществам;
- одновременный прием ингибиторов протеазы ВИЧ (атазанавир, нелфинавир).

4.4 Особые указания и меры предосторожности

При непреднамеренной потере веса, кровотечениях ЖКТ, рвоте с кровью необходимо обратиться к врачу.

Препарат не применять для профилактики.

При длительном применении возможны дефицит витамина B12, гипомегниемия, повышенный риск переломов.

4.5 Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Понижает абсорбцию лекарств, зависящих от pH желудка (например, кетоконазол).

Не рекомендуется сочетание с ингибиторами протеазы ВИЧ.

4.6 Беременность и грудное вскармливание

Не применять при беременности и в период грудного вскармливания.

4.7 Влияние на способность управлять транспортом

Не влияет или влияет незначительно. При головокружении следует воздержаться от управления ТС.

4.8 Побочные действия

Возможны: головная боль, диарея, тошнота, боль в животе, кожные реакции.

Очень редко: тяжелые аллергические реакции, поражение печени.

4.9 Передозировка

Специфического антидота нет. Лечение симптоматическое.

5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамика

Пантопразол — ингибитор протонного насоса, снижает секрецию соляной кислоты.

5.2 Фармакокинетика

Биодоступность ~77%. Метаболизируется в печени, выводится почками.

6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

6.1 Срок годности

5 лет.

6.2 Условия хранения

Хранить при температуре не выше 30 °С, в оригинальной упаковке.

7. ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

АО «КРКА, д.д., Ново место», Словения.

Дата пересмотра инструкции: 17 июня 2024 г.