

NAVODILO ZA UPORABO

Vitamin AD₃E KRKA emulzija za injiciranje za govedo, konje, prašiče, ovce, koze, kunce, pse in mačke

1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER PROIZVAJALEC ZDRAVILA, ODGOVOREN ZA SPROŠČANJE SERIJ, ČE STA RAZLIČNA

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in proizvajalec odgovoren za sproščanje serij:
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

2. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Vitamin AD₃E Krka emulzija za injiciranje za govedo, konje, prašiče, ovce, koze, kunce, pse in mačke

3. NAVEDBA UČINKOVIN(E) IN DRUGE(IH) SESTAVIN

1 ml emulzije za injiciranje vsebuje:

Učinkovine:

vitamin A (v obliki palmitata)	50.000 IE
holekalciferol (vitamin D)	25.000 IE
tokoferilacetat (vitamin E)	20 mg

Bistra do rahlo opalescentna, rumena, viskozna raztopina.

4. INDIKACIJE

Govedo, konji, prašiči, ovce, koze in kunci: zdravljenje pomanjkanja vitaminov pri rahitisu, nutritivni sterilnosti in osteomalaciji ter med okrevanjem.

Psi, mačke:

- spodbujanje rasti živali,
- zvišanje odpornosti proti okužbam,
- izboljšanje splošnega stanja živali,
- zmanjšanje stresnih učinkov pri prevozu, preselitvi in podobnem,
- preprečevanje in zdravljenje pomanjkanja vitaminov pri rahitisu, nutritivni sterilnosti in osteomalaciji ter med okrevanjem,
- motnje v prehrani.

5. KONTRAINDIKACIJE

Ne uporabite pri živalih za proizvodnjo živil, ki imajo ustrezno zalogo vitamina A zaradi možnosti kopičenja v užitnih tkivih.

Hipervitaminoze vitaminov A, D in E.

6. NEŽELENI UČINKI

Niso znani.

Če opazite kakršne koli stranske učinke, tudi tiste, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo ali mislite, da zdravilo ni delovalo, obvestite svojega veterinarja.

7. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo, konji, prašiči, ovce, koze, kunci, psi in mačke.

8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKÉ VRSTE TER POT(I) IN NAČIN UPORABE

Tega zdravila se pri vrstah za proizvodnjo živil ne sme uporabljati subkutano.

Živalim za proizvodnjo živil lahko zdravilo damo enkrat, odmerka ne smemo preseči.

Teleta, žrebeta	5 ml do 10 ml na žival, intramuskularno
Konji, govedo	10 ml do 20 ml na žival, intramuskularno
Plemenske svinje in merjasci	10 ml na žival, intramuskularno
Prašiči (50 do 100 kg)	4 do 8 ml na žival, intramuskularno
Ovce, koze	3 ml do 5 ml na žival, intramuskularno
Jagnjeta, kozličiči, pujski	1 ml do 2 ml na žival, intramuskularno
Kunci	1 ml na žival, intramuskularno
Psi, mačke	2 ml do 4 ml na žival, intramuskularno, subkutano

9. NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA

Jih ni.

10. KARENCA

Govedo: meso in organi:	243 dni
Prašiči: meso in organi:	215 dni
Konji: meso in organi:	243 dni
Ovce: meso in organi:	187 dni
Koze: meso in organi:	187 dni
Kunci: meso in organi:	122 dni

Mleko: 120 ur (5 dni)

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini.

Zaščitite pred svetlobo.

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 28 dni.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na ovojninu po {EXP}. Rok uporabnosti zdravila se nanaša na zadnji dan v navedenem mesecu.

12. POSEBNA OPOZORILA

Posebna opozorila za vsako ciljno živalsko vrsto:

Pri psih in mačkah lahko posebno visoki odmerki vitamina A povzročijo zraščanje vretenc.

Posebni previdnostni ukrepi za uporabo pri živalih:

Večkratno prekoračenje terapijskega odmerka zdravila lahko izzove nalaganje kalcija v organizmu živali. Zelo redko lahko injekcijski pripravek vitaminov AD₃E izzove preobčutljivostne (anafilaktične) reakcije.

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo:

V primeru nenamernega samo-injiciranja ni mogoče izključiti tveganja za hipervitaminozo v povezavi z vitaminom A. Zato je potrebna velika previdnost pri dajanju zdravila. V primeru nenamernega samo-injiciranja se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodila za uporabo ali ovojnino.

Študije vitamina A na laboratorijskih živalih so pokazale teratogene učinke. Nosečnice zato tega zdravila ne smejo uporabljati.

Brejest in laktacija:

Zdravila ne priporočamo za uporabo pri živalih med laktacijo. Potrebna je previdnost pri aplikaciji zdravila živalim tri tedne pred parjenjem in v prvi tretjini brejosti zaradi možnega teratogenega učinka vitamina A.

13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Glede odstranjevanja zdravil, ki jih ne uporabljate več, se posvetujte z veterinarjem. Ti ukrepi pomagajo varovati okolje.

14. DATUM ZADNJE ODOBRITEV NAVODIL ZA UPORABO

10.11.2021

15. DRUGE INFORMACIJE

Na voljo so steklenice po 100 ml.