

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Septolete Lemon 1,2 mg kietosios pastilės

Cetilpiridinio chloridas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

Septolete Lemon galima įsigyti be recepto, tačiau jį reikia vartoti tiksliai, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
- Jeigu simptomai pasunkėjo arba per 3 dienas nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją.
- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys

1. Kas yra Septolete Lemon ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Septolete Lemon
3. Kaip vartoti Septolete Lemon
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Septolete Lemon
6. Kita informacija

1. KAS YRA SEPTOLETE LEMON IR KAM JIS VARTOJAMAS

Septolete Lemon pastilės vietiškai naikina mikrobus. Jų sudėtyje yra antiseptiko cetilpiridinio chlorido, kuris naikina daugelį bakterijų ir grybelių bei šiek tiek slopina virusų vystymąsi. Šios pastilės dezinfekuoja burną ir gerklę, todėl mažina jų uždegimą bei (svarbiausia) apsaugo nuo sunkesnio bakterinio uždegimo. Dėl gerų drėkinamųjų savybių ir mažo paviršinio įtempimo cetilpiridinio chloridas patenka į sunkiai pasiekiamas burnos ir gerklės gleivinės vietas, kur slopina bakterijų augimą.

Septolete Lemon pastilių sudėtyje yra polihidroksilinių medžiagų – maltitolio ir manitolio, tačiau nėra bakterijoms augti būtino cukraus. Septolete pastilės nesukelia karieso; pastilių sudėtyje nesant cukraus, anti-septikas veikia geriau.

Šios kietosios pastilės vartojamos papildomam vietiniam peršalimo ar gripo sukeltų lengvų burnos ir ryklės infekcinių ligų (migdolų, ryklės, burnos gleivinės ar dantenu uždegimo) gydymui.

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT SEPTOLETE LEMON

Septolete Lemon vartoti negalima:

- jeigu yra padidėjęs jautrumas cetilpiridinio chloridui arba bet kuriai pagalbinei Septolete Lemon medžiagai.

Specialių atsargumo priemonių reikia:

- jeigu burnoje yra atvirų žaizdų, šių pastilių vartoti negalima, kadangi cetilpiridinio chloridas lėtina jų gijimą;
- jeigu sergama sunkia infekcine liga, pasireiškiančia aukšta temperatūra, galvos skausmu, vėmimu, būtina gydytojo konsultacija, ypač jei savijauta nepagerėja per 3 dienas;
- sergant cukriniu diabetu; kadangi kiekvienoje kietojoje pastilėje yra maždaug 1 g maltitolio. Jo hidrolizė ir absorbcija virškinimo trakte vyksta lėtai, todėl poveikiso cukraus kiekiui kraujyje yra mažas.

Nerekomenduojama vartoti didesnės dozės negu nurodyta.

Jaunesniems kaip 4 metų vaikams šių pastilių vartoti nerekomenduojama.

Kitų vaistų vartojimas

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui ar vaistininkui.

Duomenų apie Septolete Lemon kietųjų pastilių įtaką kitų vaistų poveikiui nėra

Septolete Lemon vartojimas su maistu ir gėrimais

Šių pastilių negalima vartoti prieš pat valgi, valgio metu ir su pienu.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Įrodymų, kad vartoti Septolete Lemon nėštumo metu yra saugu, nepakanka. Dėl to nėščioms moterims šis vaistas nerekomenduojamas.

Įrodymų, kad vartoti Septolete Lemon žindymo laikotarpiu metu yra saugu, nepakanka. Dėl to žindyvėms šis vaistas nerekomenduojamas.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Septolete Lemon pastilių poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus nepastebėta.

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Septolete Lemon medžiagas

Septolete Lemon pastilių sudėtyje yra natrio benzoato (E211), kuris nestipriai gali sukelti odos reakcijų, sudirginti akis ir gleivinę.

Šių pastilių sudėtyje yra maltitolio. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą.

3. KAIP VARTOTI SEPTOLETE LEMON

Septolete Lemon visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Suaugusieji ir vyresni kaip 12 metų vaikai

Sučiulpti po 1 pastilę kas 2-3 val., bet ne daugiau kaip 8 pastiles per parą.

10 - 12 metų vaikai

Sučiulpti po 1 pastilę kas 3-4 val., bet ne daugiau kaip 6 pastiles per parą.

4-10 metų vaikai

Sučiulpti po 1 pastilę kas 3-4 val., bet ne daugiau kaip 4 pastiles per parą.

Jaunesni kaip 4 metų vaikai

Septolete Lemon kietųjų pastilių nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 4 metų vaikams.

Šių pastilių negalima vartoti prieš pat valgi ar valgio metu.

Jeigu manote, kad Septolete Lemon veikia per stipriai arba per silpnai, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Pavartojus per didelę Septolete Lemon dozę

Veikliųjų medžiagų kiekis pastilėje yra mažas, todėl perdozavimas beveik neįmanomas. Per didelę dozę gali sukelti virškinimo sutrikimų, pvz., pykinimą, vėmimą ir viduriavimą. Taip atsitikus, daugiau šio vaisto vartoti negalima, reikia gerti daug vandens arba pieno ir pasikonsultuoti su gydytoju ar vaistininku.

Pamiršus pavartoti Septolete Lemon

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

Nustojus vartoti Septolete Lemon

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Septolete Lemon, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Labai dažni	Daugiau nei 1 vartotojui iš 10
Dažni	Nuo 1 iki 10 vartotojų iš 100
Nedažni	Nuo 1 iki 10 vartotojų iš 1000
Reti	Nuo 1 iki 10 vartotojų iš 10000
Labai reti	Mažiau nei 1 vartotojui iš 10000
Dažnis nežinomas	Negali būti įvertintas pagal turimus duomenis

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Reti

Pykinimas, viduriavimas, ypač pavartojus didesnę nei rekomenduojama dozę jautresniems žmonėms.

Labai reti

Padidėjusio jautrumo reakcijos (pvz., bėrimas ir sudirginimas).

Jeigu pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui

5. KAIP LAIKYTI SEPTOLETE LEMON

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės ir šviesos.

Ant dėžutės ir lizdinė plokštelės po „Tinka iki“ arba „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Septolete Lemon vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. KITA INFORMACIJA

Septolete Lemon sudėtis

- Veiklioji medžiaga yra cetilpiridinio chloridas. Vienoje kietojoje pastilėje yra 1,2 mg cetilpiridinio chlorido.

- Pagalbinės medžiagos yra skystasis maltitolis, maltitolis (E965), manitolis (E421), levomentolis, citrinų aliejus, glicerolis (E422), natūralus ricinų aliejus, bevandenis koloidinis silicio dioksidas, magnio stearatas (E572), povidonas, farmaciniai vašakai (bičių vaškas (E901), karnaubo vaškas (E903), šelakas (E904)), titano dioksidas (E171), žaliųjų citrinų skonio aromatinė medžiaga, citrinų skonio aromatinė medžiaga, apelsinų aliejaus skonio aromatinė medžiaga, geltonasis dažiklis (kurkuminas (E100), akacijos sakai (E414), maltodekstrinas, citrinų rūgštis (E330), riebalų rūgščių mono- ir digliceridų citrinų rūgšties esteriai (E472c), natrio benzoatas (E211), kalio sorbatas (E202)).

Septolete Lemon išvaizda ir kiekis pakuotėje

Septolete Lemon kietoji pastilė yra geltona, apvali, abipus truputį išgaubta. Dėžutėje yra 18 kietųjų pastilių (2 lizdinės plokštelės po 9 pastiles).

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Krka, d.d. Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovėnija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

UAB KRKA Lietuva
Senasis Ukmergės kelias 4,
Užubalių km., Vilniaus r.
LT - 14013
Tel. + 370 5 236 27 40

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2012-04-23

Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje <http://www.vvkt.lt/>