

INFORMACINIS LAPELIS
Enroxil Flavour 15 mg tablet s šunims ir kat ms

1. RINKODAROS TEIS S TUR TOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIM EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teis s tur tojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidim
KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
SLOV NIJA

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Enroxil Flavour 15 mg tablet s šunims ir kat ms
Enrofloksacinas

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Kiekvienoje tablet je yra 15 mg enrofloksacino.
Apvalios, šiek tiek abipus išgaubtos, kremin s arba rusvos tablet s, ant kuri gali b ti matomos baltos ar tamsesn s d m s, su nuožulniomis briaunomis.

4. INDIKACIJA (-OS)

Šunims ir kat ms, sergan ioms bakterij sukeltomis virškinimo trakto, kv pavimo, šlapimo ir lyties organ bei odos infekcin mis ligomis, esant antrin ms žaizd infekcijoms ir išorin s ausies uždegimui, gydyti, jei klinikin patirtis ir, jei manoma, atlikti ligos suk l j jautrumo tyrimai leidžia rinktis enrofloksacin .

5. KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti jaunesniems kaip 1 met šunims bei jaunesniems kaip 18 m nesi ypa dideli veisli šunims, kurie auga ilgiau, nes greito augimo laikotarpiu gali b ti pažeista s nario kremzl .
Negalima naudoti jaunesn ms kaip 8 savai i kat ms.
Negalima naudoti, jei šuo ar kat yra alergiška veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbini medžiag .
Negalima naudoti šunims, kuriems yra traukuliais pasireiškian i sutrikim , kadangi enrofloksacinas gali stimuliuoti centrin nerv sistem .
Negalima naudoti profilaktikai.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Greito augimo laikotarpiu enrofloksacinas gali veikti s nario kremzl s vystym si.
Labai retai (mažiau nei 1 iš 10 000 gyv n , skai uojant ir atskirus pranešimus) pasireišk v mimas ir anoreksija.
Pasteb jus bet kok sunk poveik ar kit šiame informaciniame lapelyje nepamin t poveik , b tina informuoti veterinarijos gydytoj .

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys ir katės.

8. DOZAVIMAS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Neviršyti rekomenduojamos dozės. Vaisto paros dozė yra 5 mg enrofloksacino 1 kg kūno svorio. Ji turi būti suduota iš karto ar per du kartus su dalu arba be jo. Gydyti reikia 5–10 d.

Šunų gydymo trukmė gali būti ilgesnė ir priklauso nuo klinikinės reakcijos bei veterinarinio gydytojo sprendimo.

Siekiant išvengti per mažos dozės naudojimo, gyvūnui reikia kiek manoma tiksliau pasverti, kad būtų naudojama teisinga dozė.

Paros dozė katėms ir mažiems šunims gali būti skaičiuojama taip: 1 tabletė 3 kg kūno svorio.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Tabletė sušeriama iš karto arba padalyta per du kartus su dalu arba be jo.

10. IŠLAUKA

Netaikytina.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Šiam veterinariniam vaistui specialios laikymo sąlygos nereikia.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant kartoninio dėžutės ir lizduotės po „Tinka iki“ ar „EXP“. Tinkamumo data sutampa su paskutine nurodyto mėnesio diena.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Fluorokvinolonais galima gydyti tik tuomet, jei gydymas kitomis klasių antimikrobinėmis medžiagomis yra neveiksmingas arba manoma, kad gali būti neveiksmingas.

Jei manoma, fluorokvinolonų naudojimas turi būti pagrįstas jautrumo tyrimu. Jei vaisto naudojama neatsižvelgiant VVA pateiktus nurodymus, gali padidėti bakterijų atsparumo fluorokvinolonams paplitimas bei sumažėti gydymo kitais kvinolonais veiksmingumas, kadangi galimas kryžminis atsparumas. Naudojant šį vaistą, reikia atsižvelgti oficialius bei vietinius antimikrobinių medžiagų naudojimo reikalavimus.

Vaisto negalima naudoti, jei yra atsparumas kvinolonams, kadangi pasireiškia beveik visiškai kryžminis atsparumas kitiems kvinolonams bei visiškai kryžminis atsparumas kitiems fluorokvinolonams.

Neviršyti rekomenduojamos dozės.

Jei viršijama rekomenduojama dozė, katėms gali pasireikšti retinotoksinis poveikis, skaitant aklium. Šunims, kurių inkstų ar kepenų funkcija yra labai sutrikusi, šiuo vaistu būtina gydyti atsargiai.

Enrofloksacinas patenka į patelės pieną, todėl galima naudoti tik atsakingam veterinarinio gydytoji vertinus naudos ir rizikos santykį.

Šio vaisto negalima naudoti su tetraciklinais, fenikoliais ar makrolidais, kadangi šie vaistai gali neutralizuoti norimą poveikį.

Fluorokvinolonai gali stiprinti kartu naudojamą geriamąjį antikoagulantą (kraujo krešėjimą slopinančią vaistą) poveikį.
Šio vaisto negalima naudoti kartu su teofilinu (vaistu, medicinoje naudojamu bronchams plėsti), kadangi gali pailginti jo eliminaciją.
Jei kartu naudojama magnio ar aliuminio turintis medžiaga, enrofloksacino absorbcija gali pailgėti.
Atsitiktinai perdozavus, gyvūnams gali vemti, viduriuoti, gali atsirasti centrinės nervų sistemos bei elgesio pokyčiai.
Priešnuodžio nėra, gydymas simptominis. Jei reikia, galima skirti antacidinį preparatą, kuriuose yra aliuminio ir magnio, arba aktyvios anglies, kad būtų sumažinta enrofloksacino absorbcija.

Perspėjimai naudotojui

Po naudojimo plauti rankas.

Jei vaisto pateko akis, jas būtina plauti dideliu kiekiu švaraus vandens.

Atsitiktinai prarijus, nedelsiant reikia kreiptis gydytojų ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Žmonėms, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas (fluoro)kvinolonams, turi vengti šio su veterinariniu vaistu.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEK NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

Veterinarijos gydytojas gali patarti, kaip daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2014-03-12

15. KITA INFORMACIJA

Poliamido, aliuminio ir polivinilchlorido plėvelės (OPA/AL/PVC) lizduotė, uždaryta aliuminio folija naudojant karštą. Vienoje lizduotėje yra 10 tablečių. Vienoje kartoninėje dėžutėje – 100 tablečių, esančių 10 lizduotėse.

Poliamido, aliuminio ir polivinilchlorido plėvelės (OPA/AL/PVC) lizduotė, uždaryta aliuminio folija naudojant karštą. Vienoje lizduotėje yra 10 tablečių. Vienoje kartoninėje dėžutėje – 10 tablečių, esančių 1 lizduotėje.

Gali būti platinamos nevisi dydžiai pakuotės.