

# DZIENNICZEK




domowych pomiarów  
ciśnienia tętniczego



# Prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego

Warunki pomiaru	Ciśnienie tętnicze skurczowe (mmHg)		Ciśnienie tętnicze rozkurczowe (mmHg)
Pomiar domowy	< 135	i	< 85
Pomiar w gabinecie lekarskim	< 140	i	< 90



Cele terapii nadciśnienia tętniczego są ustalane **indywidualnie dla każdego chorego**.



Zapytaj swojego lekarza prowadzącego, jakie są **górne wartości ciśnienia w Twoim przypadku**.



## Pamiętaj!

Przy zakupie aparatu do pomiaru ciśnienia sprawdź **rozmiar mankietu** – powinien być dopasowany **do szerokości Twojego ramienia**.

Pamiętaj również **o zapisywaniu częstości rytmu serca (tętna)**.

Tętno spoczynkowe powyżej 80 uderzeń na minutę zwiększa ryzyko sercowo-naczyniowe.

## Moje docelowe wartości ciśnienia tętniczego

Ciśnienie skurczowe	Ciśnienie rozkurczowe

©2019 ITEM Publishing Sp. z o.o. Sp.k.

### Konsultacja merytoryczna:

prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz

dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski

Instytut Kardiologii, Warszawa

## Jak samodzielnie wykonywać pomiary ciśnienia tętniczego?

Nie rozmawiaj 1

Usiądź 2

Wyprostuj i podeprzyj plecy 3

Podeprzyj rękę 4

Nie krzyżuj nóg 5



Dopasowany mankieta na poziomie serca

Pomiar należy wykonywać na ramieniu, na którym stwierdzono wyższe wartości ciśnienia.

## Co może wpłynąć na wynik pomiaru ciśnienia tętniczego?



Pełny pęcherz moczowy



Rozmowa



Palenie



Kawa, alkohol



Krzyżowanie nóg

# Czy wystarczy tylko obniżyć ciśnienie tętnicze, by zmniejszyć ryzyko zawału serca lub udaru mózgu?

Trzy główne modyfikowalne czynniki ryzyka zawału serca i udaru mózgu to:



Podwyższone wartości ciśnienia tętniczego



Podwyższone stężenie tzw. złego cholesterolu (LDL)



Palenie tytoniu

Samo osiągnięcie wartości docelowych ciśnienia tętniczego nie wystarcza!





**Jeżeli palisz – zaprzestań palenia**, unikaj też ekspozycji na dym tytoniowy.






**Jeżeli masz podwyższone stężenie cholesterolu – stosuj się do zaleceń lekarza.** W takich wypadkach najczęściej zaleca się leczenie lekami obniżającymi stężenie cholesterolu – statynami.

Większość chorych na nadciśnienie tętnicze powinno przyjmować, oprócz 2-3 leków obniżających ciśnienie, lek obniżający stężenie cholesterolu. W celu ułatwienia terapii możliwe jest stosowanie **2 lub 3 leków na nadciśnienie tętnicze w jednej tabletkie** lub **2 leków na nadciśnienie tętnicze z lekiem obniżającym cholesterol (również w jednej tabletkie).**



## Schemat stosowanych leków

Data wizyty: .....

Nr	Nazwa i dawka leku	Dawkowanie		
				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

..... Podpis i pieczęć lekarza



**Rano**



**Po południu  
(godz. 12-14)**



**Wieczorem**















