

ФІПРИСТ® Спот-он для котів
(розчин для зовнішнього застосування)
листівка-вкладка

Опис

Розчин для зовнішнього застосування ледь жовтого кольору.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину:

фіпроніл – 100 мг.

Допоміжні речовини: повідон К25, полісорбат 80, бутилгідрокситолуол, бутилгідроксіанізол, етанол 96%, діетиленгліколю моноетиловий ефір.

Фармакологічні властивості

АТСvet QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти (QP53AX15, фіпроніл)

Фіпроніл – похідний піразолу з інсектицидною і акарицидною дією. Він блокує ГАМК-залежні рецептори паразитів, порушує процес передачі нервових імпульсів у комах, але не має такої дії на ГАМК-рецептори ссавців.

Після нанесення на шкіру препарат кумулюється в епідермісі, волосяних цибулинах та сальних залозах тварини і має тривалу контактну інсектоакарицидну дію. Фіпроніл розповсюджується по шкірі й шерсті тварин від ділянки застосування до периферійних зон (поперекова зона, пахова зона). Концентрація фіпронілу у шерсті котів знижується до 1 мкг/г через 2 місяці після застосування препарату.

За ступенем дії на організм ФІПРИСТ® Спот-он для котів належить до помірно небезпечних речовин (3 клас безпечності), при нанесенні на шкіру в рекомендованих дозах не має місцево-подразнюючої та резорбтивно-токсичної дії, при попаданні в очі викликає подразнення. Препарат є токсичним для риб і бджіл.

Застосування

Профілактика та лікування котів при ураженнях ектопаразитами:


- блохами (*Ctenocephalides felis.*);
- кліщами (*Rhipicephalus spp.*, *Dermacentor spp.*, *Ixodes spp.*);
- вошами (*Linognathidae*);
- волосоїдами (*Felicola subrostratus*).

Профілактика та лікування блошиного алергічного дерматиту котів (FAD).

Дозування

Препарат призначають дорослим котам та кошенятам старшим 8-ми тижневого віку. Мінімальний інтервал між застосуванням препарату становить 4 тижні. Препарат наносять на суху неушкоджену шкіру тварин між лопатками у дозі – одна піпетка 0,5 мл на одну тварину.

Для нанесення препарату необхідно взяти піпетку з однократною дозою вертикально, відкрити й зняти ковпачок. Перевернути ковпачок, вставити зворотню сторону ковпачка у піпетку, натиснути й повернути ковпачок так, щоб проколоти захисну мембрану. Зняти ковпачок з піпетки, розділити шерсть тварини між лопатками, щоб було видно шкіру. Притиснути кінчик піпетки до шкіри й натиснути на піпетку кілька разів, щоб нанести весь вміст на шкіру.



Однієї дози достатньо для захисту тварини протягом 5 тижнів від ураження блохами та протягом 3-4 тижнів від ураження кліщами.

При обробці тварин препаратом не допускати потрапляння препарату в очі тварин та злизування препарату тваринами.

Протипоказання

Не застосовувати препарат тваринам віком до 8 тижнів та масою тіла менше 1 кг.

Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам.

Не застосовувати препарат для лікування інших видів тварин, особливо кролів через ризик виникнення небажаних реакцій, які можуть призвести до загибелі тварин.

Застереження

Лікування рекомендують проводити комплексно із застосуванням етіотропних, патогенетичних і симптоматичних лікарських засобів.

При виявленні кліщів на тілі тварин їх видаляють механічно (пінцетом) і лише після цього обробляють препаратом.

Препарат наносять у місця недоступні для злизування твариною. Після обробки препаратом декількох тварин не допускати, щоб тварини облизували одне одного.

Після обробки не рекомендують купати тварин впродовж 2-х діб.

За умови, що перед обробкою препаратом тварина була уражена кліщами, зараження трансмісивними захворюваннями не виключають. Після обробки препаратом впродовж 24-48 годин кліщі на тілі тварин гинуть і відпадають.

Предмети догляду та місця перебування тварин (підстилки, килимки, кошики, м'які меблі) необхідно періодично чистити та обробляти відповідними інсекто-акарицидними засобами.

Обробку тварин препаратом ФІПРИСТ® Спот-он для котів слід проводити із використанням гумовими рукавицями.

Під час роботи з препаратом не курити, не пити та не приймати їжу.

Після закінчення роботи слід вимити руки теплою водою з милом; вимити та просушити рукавиці. При випадковому попаданні препарату на шкіру або слизові оболонки його слід негайно змити проточною водою.

Після обробки препаратом тварин не можна гладити та допускати до дітей до повного висихання шерсті. Також після обробки тварин вони не повинні спати разом з господарями, особливо з дітьми.

Форма випуску

Поліпропіленові піпетки по 0,5 мл з поліетиленовими або поліоксиметиленовими ковпачками з гострим кінцем. Піпетки заповнені у картонні упакування по 3 або 10 штук, кожна піпетка у ламінованому пакеті.

Зберігання

Препарат зберігають в упакуванні виробника в сухому, захищеному від прямих сонячних променів, місці окремо від продуктів харчування та кормів за температури від 0 до 30 °С.

Термін придатності

3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

КРКА, д.д. Ново место
Шмар'єшка цеста 6, 8501 Ново место,
Республіка Словенія

KRKA, d.d., Novo mesto (Slovenia)
Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto

Виробник готового продукту

КРКА, д.д. Ново место
Шмар'єшка цеста 6, 8501 Ново место,
Республіка Словенія

KRKA, d.d., Novo mesto (Slovenia)
Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto