

**ФІПРИСТ® Спот-он для собак**  
**(розчин для зовнішнього застосування)**  
листівка-вкладка

**Опис**

Розчин для зовнішнього застосування ледь жовтого кольору.

**Склад**

1 мл препарату містить діючу речовину:

фіпроніл – 100 мг.

Допоміжні речовини: повідон К25, полісорбат 80, бутилгідрокситолуол, бутилгідроксіанізол, етанол 96%, діетиленгліколю моноетиловий ефір.

**Фармакологічні властивості**

**АТСvet QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти (QP53AX15, фіпроніл)**

Фіпроніл – похідний піразолу з інсектицидною і акарицидною дією. Він блокує ГАМК-залежні рецептори паразитів, порушує процес передачі нервових імпульсів у комах, але не має такої дії на ГАМК-рецептори ссавців.

Після нанесення на шкіру препарат кумулюється в епідермісі, волосяних цибулинах та сальних залозах тварини і має тривалу контактну інсектоакарицидну дію. Фіпроніл поширюється по шкірі й шерсті тварин від ділянки застосування до периферійних зон (поперекова зона, пахова зона). Концентрація фіпронілу у шерсті собак знижується до 3-4 мкг/г через 56 діб після застосування препарату.

За ступенем дії на організм ФІПРИСТ® Спот-он для собак належить до помірно небезпечних речовин (3 клас безпечності), при нанесенні на шкіру в рекомендованих дозах не має місцево-подразнюючої та резорбтивно-токсичної дії, при попаданні в очі викликає подразнення. Препарат є токсичним для риб і бджіл.

**Застосування**

Профілактика та лікування собак при ураженнях ектопаразитами:

- блохами (*Ctenocephalides spp.*);
- кліщами (*Rhipicephalus spp.*, *Dermacentor spp.*, *Ixodes spp.*);
- вошами (*Linognathidae*);
- волосоїдами (*Trichodectes canis*).

Профілактика та лікування блошиного алергічного дерматиту собак (FAD).

**Дозування**

Препарат призначають дорослим собакам та цуценятам старшим 8-ми тижневого віку. Препарат можна застосовувати самкам під час вагітності та лактації.

Мінімальний інтервал між застосуванням препарату становить 4 тижні. Препарат наносять на суху, неушкоджену шкіру тварин між лопатками у дозі – одна піпетка відповідного розміру на одну тварину:

для собак масою тіла 2-10 кг – піпетка 0,67 мл;

для собак масою тіла 10-20 кг – піпетка 1,34 мл;

для собак масою тіла 20-40 кг – піпетка 2,68 мл;

для собак масою тіла 40-60 кг – піпетка 4,02 мл;


для собак масою тіла понад 60 кг – піпетка 4,02 мл і відповідна піпетка з меншою дозою.

Мінімальна рекомендована доза фіпронілу становить 6,7 мг/кг маси тіла тварини.

При підвищеному ризику повторного ураження блохами, при алергії тварин на ураження блохами та кліщами, при частому купанні тварин із використанням гіпоалергічного та пом'якшуючого шампуню тварин рекомендують обробляти препаратом щомісяця. У регіонах, де спостерігаються незначні умови ураження блохами та кліщами, тварин можна обробляти препаратом ФІПРИСТ® Спот-он для собак через кожні два чи три місяці.

Для нанесення препарату необхідно взяти відповідну піпетку з однократною дозою вертикально, відкрутити і зняти ковпачок. Перевернути ковпачок, вставити його зворотню сторону у

піпетку, натиснути і повернути ковпачок так, щоб проколоти захисну мембрану. Зняти ковпачок з піпетки, розділити шерсть тварини в ділянці основи шиї або в передній частині лопаток, або між лопатками, щоб було видно шкіру. Притиснути кінчик піпетки до шкіри й натиснути на піпетку кілька разів, щоб витиснути вміст піпетки.



Препарат володіє захисним ефектом проти бліх впродовж 2-х місяців та проти кліщів впродовж 4 тижнів, залежно від епізоотичної ситуації. Після обробки препаратом блохи на шкірі тварини знищуються через 24 годин.

#### **Протипоказання**

Не застосовувати препарат тваринам віком до 8 тижнів та масою тіла менше 2 кг !

Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам !

Не застосовувати препарат для лікування інших видів тварин, особливо кролів, через ризик виникнення небажаних реакцій, які можуть призвести до загибелі тварин !

#### **Застереження**

Лікування рекомендується проводити комплексно із застосуванням етіотропних, патогенетичних і симптоматичних лікарських засобів.

При виявленні кліщів на тілі тварин їх видаляють механічно (пінцетом) і лише після цього обробляють препаратом.

Препарат наноситься на місця недоступні для злизування твариною. Після обробки препаратом декількох тварин не допускати, щоб тварини облизували одне одного.

Після обробки не рекомендується купати тварин впродовж 2-х діб і не дозволяти їм плавати в водоймах.

Тварин рекомендується купати не частіше одного разу на тиждень. При використанні пом'якшувального шампуню і щотижневому купанні можливе скорочення періоду захисту тварин від бліх до 5-ти тижнів після обробки препаратом ФПРИСТ® Спот-он для собак. Щотижневе купання тварин із використанням лікувального шампуню з 2% хлоргексидином не знижує ефективності препарату після обробки проти бліх (6 тижнів захисту).

За умови, що перед обробкою препаратом тварина була уражена кліщами, зараження трансмісивними захворюваннями не виключається. Після обробки препаратом впродовж 24-48 год. кліщі на тілі тварин гинуть і відпадають.

Після обробки препаратом не виключається ураження тварин поодинокими кліщами у період захисної дії препарату.

Предмети догляду та місця перебування тварин (підстилки, килимки, кошики, м'які меблі) необхідно періодично чистити та обробляти відповідними інсекто-акарицидними засобами.

Обробку тварин препаратом ФПРИСТ® Спот-он для собак слід проводити користуючись гумовими рукавичками.

Під час роботи з препаратом не дозволяється курити, пити та приймати їжу.

Після закінчення роботи слід вимити руки теплою водою з милом; вимити та просушити рукавички. При випадковому попаданні препарату на шкіру або слизові оболонки його слід негайно змити проточною водою.

Після обробки тварин препаратом їх не можна гладити та допускати до дітей до повного висихання препарату на шкірі. Також після обробки тварин вони не повинні спати разом з господарями, особливо з дітьми.

**Форма випуску**

Поліпропіленові піпетки по 0,67; 1,34; 2,68; 4,02 мл з поліетиленовими або поліоксиметиленовими ковпачками з гострим кінцем. Піпетки запаковані у картонні упакування по 3 або по 10 штук, кожна піпетка у ламінованому пакеті.

**Зберігання**

Препарат зберігають в упакованні виробника в сухому, захищеному від прямих сонячних променів, місці окремо від продуктів харчування та кормів за температури від 0 до 30 °С.

**Термін придатності**

3 роки.

*Для застосування у ветеринарній медицині!*

**Власник реєстраційного посвідчення**

КРКА, д.д. Ново место  
Шмар'єшка цеста 6, 8501 Ново место,  
Республіка Словенія

KRKA, d.d., Novo mesto (Slovenia)  
Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto

**Виробник готового продукту**

КРКА, д.д. Ново место  
Шмар'єшка цеста 6, 8501 Ново место,  
Ремпубліка Словенія

KRKA, d.d., Novo mesto (Slovenia)  
Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto